



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ОВЦЫ И КОЗЫ ДЛЯ УБОЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УПИТАННОСТИ

ГОСТ 5111—55

Издание официальное

БЗ 9—93

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ОВЦЫ И КОЗЫ ДЛЯ УБОЯ

Определение упитанности

ГОСТ

5111—55*

Взамен
ГОСТ 5111—49
и ГОСТ 6366—52

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР 13 октября 1955 г. Срок введения установлен

01 01.56

Проверен в 1991 г. Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2396 снято ограничение срока действия

Настоящий стандарт применяется при определении упитанности овец и коз, заготавливаемых и сдаваемых для уоя

1 Овцы и козы, заготавливаемые и сдаваемые для уоя, должны по состоянию здоровья соответствовать требованиям действующего ветеринарного законодательства.

2 По упитанности овцы и козы подразделяются на три категории: высшую, среднюю и нижесреднюю. Определение категорий упитанности производится в соответствии с нижеследующими требованиями:

Категории упитанности	Овцы	Козы
Высшая	Мускулатура спины и поясницы на ощупь хорошо развита, остистые отростки спинных и поясничных позвонков не выступают, холка может выступать, отложения подкожного жира хорошо прощупываются на пояснице, на спине и ребрах отложения жира умеренные. У курдючных овец в курдюке и у жирнохвостых овец на хвосте значительные отложения жира, курдюк хорошо наполненный	Мускулатура развита хорошо остистые отростки спинных и поясничных позвонков прощупываются и слегка выступают, холка выступает, отложения подкожного жира хорошо прощупываются на пояснице и ребрах

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (май 1994 г.) с Изменением № 1, утвержденным в августе 1986 г. (ИУС 11—86)

© Издательство стандартов, 1994

Продолжение

Категории упитанности	Овцы	Козы
Средняя	<p>Мускулатура спины и поясницы на ощупь развита удовлетворительно, моклоки и остистые отростки поясничных позвонков слегка выступают, а остистые отростки спинных позвонков заметно выступают, на пояснице прощупываются умеренные отложения подкожного жира, на спине и ребрах жировые отложения незначительные У курдючных овец в курдюке, а у жирнохвостых овец на хвосте умеренные жировые отложения, курдюк недостаточно наполнен</p>	<p>Мускулатура развита удовлетворительно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, а также моклоки выступают, холка выступает значительно, подкожные жировые отложения прощупываются на пояснице и ребрах</p>
Ниже-средняя	<p>Мускулатура на ощупь развита неудовлетворительно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков и ребра выступают, холка и моклоки выступают значительно, отложения подкожного жира не прощупываются. У курдючных овец в курдюке, а у жирнохвостых овец на хвосте имеются небольшие жировые отложения</p>	<p>Мускулатура развита неудовлетворительно, остистые отростки спинных и поясничных позвонков, ребра и моклоки значительно выступают, отложения подкожного жира не прощупываются</p>

3. Овцы и козы, не соответствующие требованиям ниже средней упитанности, относятся к тощим.

4. Споры по определению упитанности овец и коз разрешаются путем проведения контрольного убоя. Определение упитанности овец и коз в этом случае производится по качеству мяса контрольных животных в соответствии с нижеследующими характеристиками:

Категории упитанности	Баранина	Козлятина
Высшая	<p>Мышцы развиты хорошо; кости не выступают, за исключением остистых отростков позвонков в области холки; подкожный жир покрывает тушу; допускаются просветы в области холки</p>	<p>Мышцы развиты хорошо; остистые отростки спинных позвонков слегка выступают, подкожный жир покрывает тушу с просветами в области холки и таза</p>

Категории упитанности	Баранина	Козлятина
Средняя	<p>У курдючных овец в курдюке и жирнохвостых овец на хвосте имеются значительные отложения жира</p> <p>Мышцы развиты удовлетворительно, остистые отростки позвонков в области спины и ходки выступают, подкожный жир покрывает тушу тонким слоем на спине и слегка на пояснице, на ребрах, в области крестца и таза допускаются просветы</p>	<p>Мышцы развиты удовлетворительно, остистые отростки спинных позвонков выступают; умеренные отложения подкожного жира покрывают тушу на пояснице и ребрах</p>
Ниже средняя	<p>У курдючных овец в курдюке и у жирнохвостых овец на хвосте имеются умеренные отложения жира</p> <p>Мышцы развиты неудовлетворительно, кости заметно выступают; на поверхности туши местами имеются незначительные жировые отложения в виде тонкого слоя, которые могут и отсутствовать</p> <p>У курдючных овец в курдюке и у жирнохвостых овец на хвосте имеются небольшие жировые отложения</p>	<p>Мышцы развиты неудовлетворительно, кости заметно выступают, подкожные жировые отложения могут отсутствовать</p>

(Измененная редакция, Изм. № 1.)

Редактор *Т И Василенко*
 Технический редактор *Н С Гришанова*
 Корректор *Л Я Митрофанова*

Сдано в наб 15 07 94 Подп в печ 15 08 94 Усл п л 0 23 Усл кр отт 0 23
 Уч изд л 0,23 Тираж 252 экз С 1575

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва Колодезный пер, 14
 Калужская типография стандартов ул Московская, 256 Зак 1422